

[bula] EXCELLER VALLÉE S.A. - PRODUTOS VETERINÁRIOS

Bovino Suíno

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Doramectina.....1,0g

Veículo q.s.p.....100,0 mL

Indicações:

BOVINOS:

EXCELLER é indicado para o tratamento e controle dos parasitas gastrintestinais e pulmonares, carrapatos, míases (bicheiras), bernes, piolhos, ácaros da sarna.

HELMINTOS GASTRINTESTINAIS (adultos e larvas de 4º estágio):

Ostertagia ostertagi, Haemonchus spp., Haemonchus contortus (adultos), Haemonchus similis (adultos), Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia punctata, Cooperia pectinata (adultos), Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum (adultos), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adultos), Trichuris spp. (adultos).

HELMINTOS PULMONARES:

Dictyocaulus viviparus.

CARRAPATOS:

Boophilus microplus.

BERNES:

Larvas de *Dermatobia hominis*.

MIÍASES (bicheiras cutâneas):

Larvas da mosca *Cochliomyia hominivorax*.

PIOLHOS:

Linognathus vituli, *Haematopinus eurytetrus*, *Solenopotes capillatus* e *Damalimia bovis*.

ÁCAROS:

Psoroptes bovis.

SUÍNOS:

EXCELLER é indicado para o tratamento e controle dos parasitas gastrintestinais, pulmonares e renais, piolhos e ácaros da sarna.

HELMINTOS GASTRINTESTINAIS (adultos e larvas de 4º estágio):

Hyostrogylus rubidus, Ascaris suum, Strongyloides ransomi (adultos), Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis.

HELMINTOS PULMONARES:

Metastrongylus spp.

HELMINTOS RENAIIS (adultos):

Stephanurus dentatus.

PIOLHOS:

Haematopinus suis.

ÁCAROS:

Sarcoptes scabiei.

Dosagem:

BOVINOS:

Administrar EXCELLER por via subcutânea ou intramuscular, na dose de 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal (200 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

SUINOS:

Administrar EXCELLER pela via intramuscular, na dose de 1 mL para cada 33 kg de peso

corporal (300 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

Administração:

BOVINOS:

Administrar EXCELLER por via subcutânea ou intramuscular.

SUÍNOS:

Administrar EXCELLER pela via intramuscular.

Precauções:

Volumes acima de 5 mL devem, de preferência, ser fracionados em mais de um local de aplicação;

Não utilizar em bezerros destinados a vitela;

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, produtos de higiene e produtos domésticos;

Ajustar a dose de acordo com o peso para cada animal.

ATENÇÃO – PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: 28 DIAS

LEITE: 10 DIAS

SUÍNOS:

ABATE: 28 DIAS

Apresentação:

Frascos de vidro de 50, 200 e 500 mL.

Classe Terapêutica:

ECTOPARASITICIDAS (ANTI-PARASITÁRIOS)

Princípio(s) Ativo(s):

DORAMECTINA

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

8.083

Responsável Técnico:

HELOIZA HELENA BALIZA PEREIRA - CRMV: CRMV MG Nº 2211

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800 8825 533

© 2022 Bulário Veterinário
Bulas de produtos veterinários disponíveis no Brasil