

[bula] ANTICION

UZINAS QUÍMICAS BRASILEIRAS S/A

Caninos Felinos

Fórmula:

Cada 100mL contém:

Acetato de medroxiprogesterona. . . . . 5 g

Veículo q.s.p. . . . . 100 mL

Indicações:

Cadelas e Gatas ANTICION é indicado como inibidor do estro em cadelas e gatas, nas seguintes condições: - quando uma possível gestação acarretar risco de vida para o animal;  
- quando houver riscos cirúrgicos para uma ovariectomia;  
- nos casos de ninhadas indesejadas.

Dosagem:

**AGITE BEM ANTES DE USAR**

Para completa eficácia do produto, recomenda-se verificar com o Médico Veterinário a fase do ciclo em que se encontra o animal. O exame deve ser realizado por anamnese, esfregaço ou toque vaginal.

Uma única aplicação de Anticion durante o anestro, é suficiente no controle do estro por um período de 4 meses em gatas e 5/6 meses em cadelas.

Dose: Cadela ou Gata: 1mL (50 mg de acetato de medroxiprogesterona), independente do peso da fêmea.

Em geral em cadelas: Aplicar Anticion 4 a 5 meses após o cio ou 1 a 2 meses após o parto. Intervalo de 5/6 meses entre as aplicações.

O reaparecimento do cio é variável e depende de vários fatores, como condição corporal da fêmea, resposta individual ao tratamento, época do ano, convivência com outras fêmeas e presença de enfermidades (variação de 5 a 22 meses).

Em gatas: aplicar 2 a 4 semanas após o cio ou 15 a 20 dias após o parto ou uma semana após desmame dos filhotes.

Para controle permanente do estro em gatas, aplicar a cada 4 meses.

Recomenda-se acasalar as fêmeas somente após o retorno do segundo cio.

**Administração:**

Aplicar durante o anestro, por via subcutânea de preferência em local pouco visível como: interior da coxa ou parte interna do dobra do flanco.

**Precauções:**

- O acetato de medroxiprogesterona pode provocar no local da aplicação; adelgaçamento da pele, alterações da pigmentação ou diminuição do pelo.
- Pode ocorrer aumento de mamas e produção láctea em certas cadelas (principalmente da raça galga), nestes casos recomenda-se suspender o tratamento.
- Nos tratamentos contínuos, o animal deve ser cuidadosamente monitorado e realizado o exame clínico de averiguação de possível desenvolvimento de nódulos mamários, ou outras reações ao tratamento progestacional.
- A aplicação de progesterona acarreta efeitos secundários em alguns animais podendo desenvolver hiperplasia cística uterina do endométrio, mucometrite, piometrite e piometra.
- Geralmente estas modificações desaparecem na interrupção do tratamento, devendo-se prevenir os proprietários de cadelas ou gatas de uma possível necessidade de uma ovariectomia, impossibilitando definitivamente a capacidade reprodutiva da fêmea.

**Contraindicações:**

A administração de Anticion é contraindicada:

- na fase de proestro, estro e metaestro. Para a correta identificação da fase do ciclo, efetuar anamnese, esfregaço ou toque vaginal, principalmente nas gatas onde o período de anestro pode não ocorrer;
- em animais com antecedentes de doenças genito-urinárias ou com hemorragia uterina anormal;
- em animais apresentando corrimento vaginal persistente ou anormal;
- na falsa prenhez ou em animais com antecedentes de falsa prenhez em alguns casos;
- quando houver outras anomalias reconhecíveis do sistema endócrino ou reprodutor;
- na presença de tumores mamários que podem ser estimulados sob a influência de atividade progestacional; -em cadelas destinadas à reprodução.

**Apresentação:**

- Caixa com 36 ampolas de 1mL
- Caixa com 36 cartelas contendo 1 ampola de 1mL acompanhado de 1 seringa.

**Classe Terapêutica:**

HORMÔNIOS/SIMILARES

**Princípio(s) Ativo(s):**

## OUTROS

Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

6.762/1.999

Responsável Técnico:

Thaís Marino Silva Girio - CRMV: 17.469

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800-16-00-24

© 2021 Bulário Veterinário  
Bulas de produtos veterinários disponíveis no Brasil